










COMMISSIONE FITOPATOLOGICA PER LA VITE DELLA ZONA DEL
SOAVE – DURELLO – ARCOLE

SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.30

DATA	11/07/2019	BOLLETTINO N°12					Da effettuarsi entro
	Gio 11	Ven 12	Sab 13	Dom 14	Lun 15	Mar 16	Mer 17
							
	19° 26°	17° 30°	19° 30°	18° 30°	18° 31°	18° 30°	18° 29°

TRATTAMENTO: per la maggior parte dei vitigni il GRAPPOLO è ANCORA SENSIBILE AGLI ATTACCHI DI PERONOSPORA E OIDIO .	Entro le eventuali piogge
--	----------------------------------

ZONE INTERESSATE	TUTTE
-------------------------	-------

VITIGNI INTERESSATI	TUTTI
----------------------------	-------

	PRODOTTI (principi attivi)	DOSI
PERONOSPORA	<p>PER LE ZONE DI FONDOVALLE E DI PIANURA dove vi è la presenza di macchie e la vite sta ancora vegetando, si consiglia di mantenere intervalli minimi di etichetta, aver cura di ripristinare la copertura prima di eventuali piogge.</p> <p>PER LE ZONE DI ALTA COLLINA dove la vite ha rallentato lo sviluppo vegetativo è possibile intervenire con intervalli di 8/10 giorni.</p>	Da etichetta
OIDIO	ZOLFI Bagnabili, NELLE ZONE PIÙ SENSIBILI ALLA MALATTIA E PER LE VARIETÀ MEDIO TARDIVE FARE MOLTA ATTENZIONE, UTILIZZARE PRODOTTI SPECIFICI O INTERVENTI POLVERULENTI	Da etichetta

TIGNOLETTA: SI STA COMPLETANDO IL VOLO DI II GENERAZIONE ANCHE NELLE ZONE DI ALTA COLLINA, VALUTARE IL PERIODO DI UTILIZZO DEI LARVICIDI NEI PROSSIMI GIORNI ANCHE NEI CASI DI FORTE DILAVAMENTO.

EVITARE L'UTILIZZO DI CLORPHIRIPHOS METIL NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI E IN ZONE SENSIBILI.

BOTRITE: DAL MOMENTO DELL'INVAIATURA È VIETATO L'UTILIZZO DI PRODOTTI ANTIBOTRITICI DI SINTESI, SEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI RELATIVAMENTE ALL'AVVERSITÀ MUFFA GRIGIA.

NOTA:

IRRIGAZIONE: PER LE ZONE DI MEDIA E ALTA COLLINA, DOVE È POSSIBILE PROSEGUIRE CON LE OPERAZIONI DI IRRIGAZIONE.

Su vigneti a guyot, si consigliano interventi di cimatura LEGGERE ma frequenti.

Per le forme di allevamento a pergola: aver cura di sistemare la vegetazione per bagnare bene i grappoli, mantenere inoltre una apertura della vegetazione nell'interfila per aumentare la ventilazione del sotto chioma.

SI RACCOMANDA DI RIDURRE LA VELOCITÀ DI AVANZAMENTO E AUMENTARE I VOLUMI DI IRRORAZIONE.