

		BOLLETTINO FITOSANITARIO			
---	--	---------------------------------	---	---	--

COMMISSIONE FITOPATOLOGICA PER LA VITE DELLA ZONA DEL
SOAVE – DURELLO – ARCOLE
SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578
 DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.30

DATA	10/07/2018	BOLLETTINO N°	13
------	------------	---------------	----

TRATTAMENTO DA ESEGUIRSI ENTRO		Per la maggior parte dei vitigni a grappolo è ancora sensibile agli attacchi di Peronospora e Oidio
ZONE INTERESSATE	TUTTE	
VITIGNI INTERESSATI	TUTTI	
	PRODOTTI (principi attivi)	DOSI
PERONOSPORA	<p>PER LE ZONE DI FONDOVALLE E DI PIANURA dove vi è la presenza di macchie, e la vite sta ancora vegetando si consiglia di mantenere intervalli minimi di etichetta. Aver cura di ripristinare la copertura prima delle eventuali piogge.</p> <p>PER LE ZONE DI ALTA COLLINA dove la vite ha rallentato lo sviluppo vegetativo è possibile intervenire con intervalli di 8/10 giorni</p>	Da etichetta
OIDIO	ZOLFI bagnabili, nelle zone più sensibili alla malattia e per la varietà medio tardive fare molta attenzione utilizzare prodotti specifici o interventi polverulenti	Da etichetta
BOTRITE	Dal momento dell'invaiaatura è vietato l'utilizzo di prodotti antibotritici di sintesi, seguire attentamente le indicazioni riportate nel registro dei trattamenti relativamente all'avversità muffa grigia	

Note Agronomiche:

IRRIGAZIONE: per le zone di media e alta collina, dove è possibile iniziare ad irrigare.

Su vigneti a Guyot si consigliano interventi di cimatura leggera, ma frequenti.

Per le forme di allevamento a pergola: aver cura di sistemare la vegetazione per bagnare bene i grappoli, mantenere inoltre una apertura della vegetazione nell'interfila per aumentare la vegetazione del sottochioma.

Si raccomanda di ridurre la velocità di avanzamento e aumentare i volumi di irrorazione.

