

DIFESA ANTIPARASSITARIA 2021

Bollettino n° 02 del 4 Maggio 2021

Trattamento	Da effettuare entro 8 MAGGIO o comunque prima di eventuali piogge.
Vitigni interessati	TUTTI con vegetazione oltre ai 10/15 cm.
Peronospora	COPERTURA con eventuale aggiunta di Fosfiti, Fosfonati o Fosetil alluminio
Oidio	ZOLFI BAGNABILI a dose massima, o PRODOTTI SPECIFICI, FARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI VIGNETI COLPITI LO SCORSO ANNO e VARIETÀ SENSIBILI.
Cocciniglia farinosa	E' iniziata la migrazione delle neanidi di prima generazione da sotto il retidoma alle foglioline basali dei germogli, si prevede che con la stabilità meteo e l'aumento della temperatura, la fase di migrazione subisca una rapida accelerazione. Per eventuali interventi consultare i tecnici.
Nota agronomica	<ul style="list-style-type: none"> - Viste le condizioni climatiche, è consigliabile l'aggiunta di concimazioni fogliari o di Bio-stimolanti. - Si consiglia di iniziare le operazioni di scacchiatura dei DOPPI GERMOGLI, pulizia del fusto e della TESTA DEI GUYOT. - Spollonatura chimica: vista la grande disformità si consigliano più passaggi, evitare che i polloni superino i 15 cm, oltre tale dimensione i prodotti specifici tendono a non disseccare il pollone stesso.

SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00