

DIFESA ANTIPARASSITARIA 2022

Bollettino n° 07 del 07 Giugno 2022

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA

In base all'attuale struttura della popolazione di *Scaphoideus titanus* e ai dati dei modelli previsionali dedicati, secondo il Decreto Regione del Veneto n° 30 del 12 maggio 2022 che, **OBBLIGA per tutta la PROVINCIA di VICENZA le ZONE DOC SOAVE, DURELLO e ARCOLE, almeno 2 interventi insetticidi contro lo *Scaphoideus titanus*.**

I fenogrammi ufficiali di ieri e oggi documentano quanto segue:

-areale di pianura tra Verona e Vicenza (31 mslm): 30% 1° età, 50% 2° età, 20% 3° età (UniVR)

-areale di collina a Est di Verona (96 mslm): 36% 1° età, 41% 2° età, 23% 3° età (UniVR);

quindi, il periodo idoneo per intervenire è il seguente:

1° trattamento obbligatorio in CONVENZIONALE:

dal 10 giugno al 16 Giugno 2022

- Flupyradifurone, Acetamiprid e Sulfoxaflor *sulle forme giovanili*

2° trattamento obbligatorio in **BIOLOGICO**, a distanza di 7-8 giorni dal precedente trattamento.

- Piretro

ATTENZIONE; il **Decreto IMPONE**, oltre alla lotta chimica, **di procedere alla ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SINTOMATICA** o alla capitozzatura delle piante durante la stagione vegetativa e la successiva estirpazione.

Inoltre, **SI CONSIGLIA:**

1. **Aver cura di bagnare molto bene la vegetazione**, tutta la chioma **ed eventuali polloni presenti sul fusto e giovani viti**, quindi **evitare i bassi volumi**;
2. **Prima del trattamento eseguire lo sfalcio dell'erba**, eseguire le operazioni a verde in modo che il prodotto insetticida arrivi e permanga il più possibile su tutta la chioma della vite;
3. **Utilizzare la dose riportata in etichetta, ESEGUENDO IL TRATTAMENTO CON IL SOLO INSETTICIDA, NON in miscela con altri prodotti** ed **eventualmente acidificare l'acqua della miscela** (il pH deve essere sempre inferiore a 7);
4. Eseguire qualsiasi pratica agronomica, inclusi gli altri trattamenti fitosanitari, almeno 2-3 giorni prima del trattamento insetticida, in modo da favorire la risalita dell'insetto sulla vite; attendere qualche giorno anche in caso di pioggia battente, che potrebbe disturbare l'insetto facendolo cadere nel sottofila;

SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00

ALCUNE FOTO dei SINTOMI a metà giugno 2020 : (Foto Posenato G. e Rama G.)

Il primo sintomo adesso su garganega è il disseccamento dei grappoli, l'accartocciamento fogliare è tardivo e molto lento;

I sintomi successivi possono interessare diversi organi della pianta o solo una parte. **Il sintomo classico è il ripiegamento dei margini fogliari verso il basso**, che inizialmente può essere solo accennato, per poi aumentare in maniera progressiva fino alla **non lignificazione dei tralci**.



Sintomi su TREBBIANO di SOAVE



Pinot GRIGIO



Foglia di MERLOT




Grappolo di Garganega TREBBIANO di Soave



(ALLEGATO 1)

Scheda di riconoscimento degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus*



Caratteri morfologici utilizzati per distinguere le 5 età giovanili di *S. titanus*.

SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00

Consorzio Tutela Vini Soave
Vicolo Mattielli, 11 37038 – Soave (VR)
Tel. +39 045 7681578 / Fax. +39 045 6190306
consorzio@ilsoave.com