

# DIFESA ANTIPARASSITARIA 2022

Bollettino n° 08bis RIBATTUTA S. TITANUS del 16 Giugno 2022

## **LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA**

In base all'attuale struttura della popolazione di *Scaphoideus titanus* e ai dati dei modelli previsionali dedicati, secondo il Decreto Regione del Veneto n° 30 del 12 maggio 2022 che, **OBBLIGA per tutta la PROVINCIA di VICENZA le ZONE DOC SOAVE, DURELLO e ARCOLE, almeno 2 interventi insetticidi contro lo *Scaphoideus titanus***. Visti i I fenogrammi ufficiali di inizio settimana

-areale di pianura tra Verona e Vicenza (31 mslm): 19% 1° età, 34% 2° età, 44% 3° età, 3% 4° età (UniVR);  
-areale di collina a Est di Verona (96 mslm): 19% 1° età, 38% 2° età, 30% 3° età, 10% 4° età; 3% 5° età (UniVR);

il periodo idoneo per intervenire con il **2° INTERVENTO OBBLIGARIO** NELLA DIFESA CONVENZIONALE è il seguente: **DAL 20 al 27 Giugno**

**IN OGNI CASO, QUESTO TRATTAMENTO VA ESEGUITO A DISTANZA DI 10-12 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO**

CON:

Piretroidi come **Acrinatrina- Etofenprox- Tau-fluvalinate o Deltametrina**

N.B. Nelle Linee Tecniche della Regione Veneto è riportato quanto segue:  
max 3 interventi/anno con piretroidi indipendentemente dall'avversità  
(massimo 2 contro S. Titanus e massimo 1 con Etofenprox)

**Difesa BIOLOGICA, 3° TRATTAMENTO OBBLIGATORIO:**  
INTERVENIRE A DISTANZA DI 7/8 GG DAL PRECEDENTE;  
negli areali fortemente colpiti dalla malattia è preferibile il trattamento con Piretro.

*ATTENZIONE; il Decreto IMPONE, oltre alla lotta chimica, di procedere alla ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SINTOMATICA o alla capitozzatura delle piante durante la stagione vegetativa e la successiva estirpazione. Inoltre, SI CONSIGLIA:*

1. **Aver cura di bagnare molto bene la vegetazione**, tutta la chioma **ed eventuali polloni presenti sul fusto e giovani viti**, quindi **evitare i bassi volumi**;
2. **Prima del trattamento eseguire lo sfalcio dell'erba**, eseguire le operazioni a verde in modo che il prodotto insetticida arrivi e permanga il più possibile su tutta la chioma della vite;
3. **Utilizzare la dose riportata in etichetta, ESEGUENDO IL TRATTAMENTO CON IL SOLO INSETTICIDA, NON in miscela con altri prodotti ed eventualmente acidificare l'acqua della miscela (il pH deve essere sempre inferiore a 7)**;
4. Eseguire qualsiasi pratica agronomica, inclusi gli altri trattamenti fitosanitari, almeno 2-3 giorni prima del trattamento insetticida, in modo da favorire la risalita dell'insetto sulla vite; attendere qualche giorno anche in caso di pioggia battente, che potrebbe disturbare l'insetto facendolo cadere nel sottofila.

**SEGRETERIA TELEFONICA 045 7681578**

DALLE 12.30 ALLE 14.30 E DOPO LE 18.00